

NITROGENO

46-00-00

UltraKel[®]
UREA-L

- Sin Alteraciones Bacteriostáticas.
- Potente Nitrógeno Proteico al 46.30%.
- Adicionado con Aminoácidos Libres.
- Altamente compatible.
- Incrementa la Microbiota del Suelo.



“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”.

INGREDIENTE ACTIVO.	% En Peso
Nitrógeno Total De los cuales son: Nitrógeno Amoniacal y Proteína Hidrolizada de Nitrógeno	46.30
Ácidos húmicos y Ácidos fúlvicos. No menos de	08.52
Aminoácidos Diversos. No menos de	04.50
Microelementos en forma de trazas EDTHA hidrolizadas. No menos de	16.47
Cuenta Bacteriana. De los cuales Rhizobium s. p. y Azospirillum s. p. No menos de	10.24
INGREDIENTES INERTES: Diluyentes (agua), humectante, antiespumante, quelante y compuestos relacionados.	13.97
TOTAL	100.00



REG. RSCO-FETE-2485-752-562-946

Titular del registro, formulador y distribuidor:
INDUSTRIAS KINSA DE MEXICO S. DE R.L., DE C.V.
Carretera Mexicali San Luis Km. 12, Mexicali, Baja California. 21911. México
Tel. 01 33 2480 4273. Web. www.kinsamex.com
E-mail. kinsamex@gmail.com.mx

UltrakeL UREA-L® Es un fertilizante Activado Quelatado y Huminatado de Alta Concentración, 100% biodegradable a base de Proteína de Nitrógeno Hidrolizada. Diseñada especialmente para incorporar y estimular el crecimiento vigoroso y potente de la planta con los aminoácidos y microorganismos así como también potencializa un intenso colorido de plántulas, trasplantes, arboles frutales, etc.. Además su formulación esta perfectamente balanceada para obtener resultados inmediatos.

Por su composición **UltrakeL UREA - L**® puede ser aplicado en follaje o suelo, para lo cual en aplicaciones foliares activa el crecimiento vegetal estimulando los procesos fisiológicos y bioquímicos de las plantas; en aplicaciones al suelo incrementa la fertilidad y mejora la estructura de estos.

UltrakeL UREA-L® Puede ser aplicado durante todo el ciclo del cultivo, y cuando el productor requiera el resultado del nitrógeno pero sin afectaciones alarmantes como lo son alteraciones de bacterias u hongos; especialmente después del trasplante, podas y letargos invernales, en prefloración, floración, fructificación y amarre de frutos; así como también al presentarse una sequia severa, salinidad o acidez o bien cuando haya presentado daños por climas extremos, intoxicaciones por plaguicidas. Este producto es altamente compatible y queda a criterio del aplicador combinarlo (incluyendo calcio).

Dosis Recomendada L/ha	Época de aplicación
1.0 a 1.5 litros por 100 de agua (Suelo - Foliar)	En verano o estiaje. Aplicar las dosis recomendadas en suelo o bien foliar según sea requerido por demanda de la complicación climática.
2.0 a 3.0 litros por cada 100 de agua (Suelo)	Trasplantes en campo: Aplique de 50 a 100 cc de solución por después de 15 días del trasplante, usando las dosis altas en frutales. Repetir el tratamiento tres veces mínimo a intervalos de 15 días.
1.0 a 2.0 litros por cada 200 de agua (Foliar)	
4.0 a 6.0 litros por hectárea (Suelo)	Proceso de floración, fructificación y/o cosecha: Aplique el producto disuelto en el agua solo o acompañado de otros fertilizantes. Repetir el tratamiento tres veces mínimo a intervalos de semana.
2.0 a 3.0 litros por hectárea (Foliar)	
4.0 a 5.0 litros Por cada 100 de agua	Frutales establecidos: Aplique un litro de solución por cada metro de altura del árbol en forma homogénea en el área radicular. Riegue inmediatamente después de la aplicación.
Solución de 30 cc por Litro de agua al suelo	Proceso correctivo de fisiopatía clorótica, en ausencia de materia orgánica. De preferencia reforzar la aplicación foliar-suelo.
Solución de 15 cc por litro de agua al follaje	