

Spot-KoloR®

BF-460

- Potente Fito corrector Hidrolizado.
- Uniformiza el Color del Fruto.
- Intensifica el Color del Fruto.
- Aporta Nutrientes para Calibre y Turgencia del fruto.
- Altamente compatible.



“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”.

INGREDIENTE ACTIVO.	% En
Ingredientes activos:	Peso
Sacarosas en forma de	
Galactosa	22.21
Aminoácidos Libres	18.72
Flavonoides de tipo:	
Cianidina - Antocianos	02.98
Antioxidantes como:	
Carotenos - Xantofilas	02.69
Citocininas (6BAP)	02.67
Fosforo (P)	02.51
Exts. Fúlvicos	02.11
Exts. Húmicos	02.08
Quelatos EDTA	01.92
Ac. Glutámico	01.57
Ac. Fólico	01.23
Ingredientes Inertes:	
Diluyentes y compuestos relacionados.	39.31
TOTAL	100.00

Spot-KoloR BF-460® Es un Bioestimulante lipocomplejo para flores o frutos ya que actúa como un potente activador de la coloración de los cultivos. Tiene la propiedad de neutralizar a nivel celular los radicales negativos, reduciendo el daño producido por estos efectos sobre el fruto o flores, mejorando el estado vegetativo de la planta, evitando la desnaturalización de proteínas y enzimas, regulando el nivel de solutos, manteniendo un nivel fotosintético y respiratorio óptimo. Teniendo como objetivo 1. Uniformizar y mejorar el color. 2. Mejorar calibre y turgencia.

Spot-KoloR BF-460® Es un aporte equilibrado responsable de la intensidad del color, incluso en la época de maduración directamente enfocado al mojado de frutos o flores, tiene un efecto directo sobre la acumulación de pigmentos como antocianinas agregando la mejora de la resistencia del tejido y sus calidades organolépticas del fruto. La coloración final estará determinada por los antocianos presentes, el pH vacuolar y la presencia de flavonoides.

Spot-KoloR BF-460® Se utiliza en aplicación foliar para todos los cultivos en los que se desee mejorar y uniformizar el color y la maduración. Incrementando su aporte a partir del cuajado y principio de engorde de frutos favoreciendo la radiación recibida desde la floración por su concentrado de aminoácidos y reducir el estrés abiótico, debe aplicarse en los meses de mayor intensidad lumínica. Realizando un tratamiento dependiendo del cultivo y estado vegetativo. Está diseñado para favorecer los procesos fisiológicos y sus reacciones bioquímicas involucradas en la generación del color, que dependen fundamentalmente, de la fotosíntesis, glicólisis, ciclo de las pentosas -fosfatos y cianidina. Las tonalidades finales que muestra un fruto, también incluyen una parte de clorofila y de carotenos, los que llegan necesariamente como producto de la maduración del fruto. El manejo de fotosíntesis es de relativa facilidad, bajo el supuesto de condiciones climáticas estables. Se recomienda reducir el nitrógeno esto es debido a que reduce la estimulación de enzimas y pigmentos vegetales mencionados anteriormente, pudiendo retrasar la coloración o incluso alterarla una vez la tiene.



REG. RSCO-FETE-2485-752-562-784

Titular del registro, formulador y distribuidor:
INDUSTRIAS KINSA DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Carretera Mexicali San Luis Km. 12, Mexicali, Baja California. 21911. México
Tel. 01 33 2480 4273. Web. www.kinsamex.com
E-mail. kinsamex@gmail.com.mx

Dosis Recomendada L/ha

- 1. a 2. litros por cada 100 de agua (Suelo)
- 0.5 a 1.0 por 100 de agua (Foliar)
- 0.5 a 1.0 litro por cada 100 de agua (Foliar)
- 1.0 a 1.5 litros por cada 200 de agua (Foliar)
- 5 a 10 cc por Litro de Agua
- 10 a 15 cc por Litro de agua

Época de aplicación

- Frutales establecidos: Aplique un litro de solución por cada metro de altura del árbol en forma homogénea en el área radicular. Riegue inmediatamente después de la aplicación.
- Se deberá aplicar directamente al fruto o flor, no causara daño alguno y será favorable para la coloración.
- Proceso de floración, fructificación y/o cosecha: Aplique el producto disuelto en el agua solo o acompañado de otros fertilizantes. Repetir el tratamiento tres veces mínimo en intervalos de semana.
- Las dosis altas en frutales. Repetir el tratamiento tres veces mínimo a intervalos de 15 días. Mezclar con Carbohidratos y/o Potasios.
- Proceso correctivo Metabólico de preferencia reforzar la aplicación foliar-suelo, con fitohormonas, Potasio y/o Calcio.
- En suelo preferentemente en Drench o inyectado para una mejor cobertura radicular.