DiMeniL® CE 810

- Potente Fungicida Dimetomorf + Clorotalonil.
- Respuesta Inmediata en Control y Prevención.
- Altamente compatible.
- Adicionado con Amortizadores Toxicológicos.

KINSAMEX®

FUNGICIDA

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”.

INGREDIENTE ACTIVO.	% En Peso
Ingredientes activos:	
Dimetomorf: (E, Z) 4- [3-(4-clorofenil) - 3 - (3,4-dimetoxifenil) acriloil) morfolina.	
No menos de (Equivalente a 100 g de I.A./L).	08.10
Clorotalonil: Tetracloroisoftalonitrilo.	
No menos de (Equivalente a 500 g i.a./L)	39.88
Ingredientes Inertes:	
Diluyente, portadores sólidos, dispersantes, adherentes y agente de suspensión, antiespumante, colorante, amortizadores de toxicidad y compuestos relacionados.	52.02
TOTAL	**100.00**

KINSAMEX®

REG. RSCO-FUNG-2485-752-562-329

Titular del registro, formulador y distribuidor:
INDUSTRIAS KINSA DE MEXICO S. DE R.L.. DE C.V.
Carretera Mexicali San Luis Km. 12, Mexicali, Baja California. 21911. México
Tel. 01 33 2460 4273. Web. www.kinsamex.com
E-mail. kinsamex@gmail.com.mx

DiMeniL 810 CE ® Es un fungicida que protege cultivos contra enfermedades como Mildiu y Tizón Tardío los cuales hacen referencia a un grupo de hongos fitopatógenos causantes de enfermedades en las plantas y que muestran síntomas similares. Generalmente sobreviven al invierno y afectan las hojas, los tallos y los frutos, en los que pueden aparecer en cualquier fase del desarrollo del cultivo, manifestándose las lesiones inicialmente en forma de pequeñas manchas negras, que crecen con rapidez. Este hongo presenta una rápida dispersión, de manera que si no hay medidas preventivas, en pocas horas pueden causar la defoliación y muerte de las plantas.

DiMeniL 810 CE ® Evita la aparición y crecimiento de estos hongos empleado regularmente, contribuirá notablemente para que desaparezcan los síntomas de infección, permaneciendo más tiempo con las plantas sanas en los cultivos de vegetales. Es importante iniciar las aplicaciones cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo del hongo y antes de que aparezcan los síntomas, además, se recomienda hacer rotación con fungicidas de diferente grupo químico y/o modo de acción.

DiMeniL 810 CE ® Viene en forma liquida y puede ser aplicado sólo o combinado con otros plaguicidas en aspersiones terrestres o foliares. Para efecto correctivo indagarse de la dosis correcta con el ingeniero en campo.

COMPROMISO COMO EMPRESA RESPONSABLE Nuestros productos se caracterizan por no ejercer impacto nocivo mortal en animales domésticos, usos perjudiciales que atente con la vida humana adicionando amortizadores o bien bajando la viscosidad a líquidos cuyo objetivo es impedir o reducir el riesgo de muerte, no obstante siga las instrucciones para evitar intoxicaciones graves.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Papa (7) Jitomate (4)	Tizón tardío (*Phytophthora infestans*)	2.5 L./ha.	Iniciar las aplicaciones cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo del hongo y antes que aparezcan los síntomas de infección; continuar con las aplicaciones a intervalos de 5 a 7 días. Durante el ciclo del cultivo, no hacer más de 4 aplicaciones consecutivas sin intercalar con fungicidas de distinto modo de acción.
Pepino Melón Calabaza Calabacita (SL)	Mildiú (*Pseudoperonospora cubensis)*		
Cebolla (7)	Mildiú (*Peronospora destructor)*		
Cultivos en condiciones de agricultura protegida			
Jitomate Chile Chile bell (SL)	Tizón tardío (*Phytophthora infestans)*	6.0 a 8.0 ml / L de agua	Realizar 4 aplicaciones a intervalos de 7 días, de forma preventiva cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.
Pepino Melón Calabacita (SL)	Mildiú (*Pseudoperonospora cubensis)*	6.0 a 8.0 ml / L de agua	