

AbaTinA[®] CE

190-L

- Potente Insecticida Agrícola.
- Abamectina 1.92% de Respuesta Inmediata.
- Altamente compatible.
- Adicionado con Amortizadores Toxicológicos.



INSECTICIDA



“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”.

INGREDIENTE ACTIVO.	% En Peso
Ingredientes activos:	
Abamectina (avermectina): Mezcla de avermectinas, conteniendo no más del 80% de avermectina B1a y no menos del 20% de avermectina B1b. (Equivalente a 19 g de i.a./L a 20°C).	01.92
Ingredientes Inertes:	
Diluyente, portadores sólidos, dispersantes, adherentes y agente de suspensión, antiespumante, colorante, amortizadores de toxicidad y compuestos relacionados.	98.08
TOTAL	100.00

AbaTinA 190 CE ® Tiene como ingrediente activo a la abamectina, la cual controla los ácaros e insectos fitófagos aquí indicados. Este producto tiene actividad translaminar que controla estados móviles de ácaros, así mismo, estados larvales de minadores de hojas y gusano alfiler, inmovilizando a la plaga poco después de la exposición, alcanzando la mortalidad máxima entre los 3 a 6 días después de ser aplicado. Producto presentado en forma de concentrado emulsionable para su aplicación al follaje con equipo terrestre o aéreo. Con el fin de dificultar la aparición de resistencias, es recomendable realizar rotaciones con productos de diferente modo de acción. **AbaTinA 190 CE** ® Al ser aplicado apropiadamente penetra en el tejido de las hojas formando un depósito de ingrediente activo, proporcionando una actividad residual contra las plagas que se alimentan del follaje las cuales son afectadas al ingerir el producto.

AbaTinA 190 CE ® Viene en forma líquida y puede ser aplicado sólo o combinado con otros plaguicidas en aspersiones terrestres o foliares. Para efecto correctivo indagarse de la dosis correcta con el ingeniero en campo.

COMPROMISO COMO EMPRESA RESPONSABLE Nuestros productos se caracterizan por no ejercer impacto nocivo mortal en animales domésticos, usos perjudiciales que atente con la vida humana adicionando amortizadores o bien bajando la viscosidad a líquidos cuyo objetivo es impedir o reducir el riesgo de muerte, no obstante siga las instrucciones para evitar intoxicaciones graves



REG. RSCO-INAC-2485-752-562-241

Titular del registro, formulador y distribuidor:
INDUSTRIAS KINSA DE MEXICO S. DE R.L., DE C.V.
Carretera Mexicali San Luis Km. 12, Mexicali, Baja California. 21911. México
Tel. 01 33 2480 4273. Web. www.kinsamex.com
E-mail. kinsamex@gmail.com.mx

Cultivo	Plaga (Nombre Común)	Plaga (Nombre Científico)	Dosis L/Ha
Apio (3)	Ácaros	<i>Tetranychus spp.</i>	0.3 - 1.2 o mínimo 60 mL/100 L de agua
Cítricos (7)	Arador de los cítricos Ácaro blanco Ácaro de dos manchas	<i>Phyllocoptruta oleivora</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tetranychus urticae</i>	0.4 - 1.5 + 0.25% de aceite mineral agrícola o mínimo 20 mL + 250 ml de aceite/100 L de agua
Fresa (3)	Araña roja Araña ciclamina Ácaro de dos manchas	<i>Tetranychus spp.</i> <i>Steneotarsonemus pallidus</i> <i>Tetranychus urticae</i>	0.5 - 1.2 o mínimo 100 mL/100 L de agua. 0.5 - 1.0 L/Ha
Jitomate (tomate) 3	Araña roja Minadores de hoja Gusano alfiler Pulgón saltador	<i>Tetranychus spp.</i> <i>Liriomyza spp.</i> <i>Keiferia lycopersicella</i> <i>Bactericera cockerelli</i>	0.3 - 1.2 o mínimo 60 mL/100 L de agua. 0.5 - 1.2 L/Ha o mínimo 100 mL/100 L de agua. 0.5 - 0.75
Rosas Crisantemos Gerberas Claveles (NA)	Ácaros Minador de la hoja	<i>Tetranychus spp.</i> <i>Liriomyza spp.</i>	0.5 - 1.5 o 50 - 100 mL/100 L de agua.
Calabacita Melón Pepino Sandía (3)	Minador de la hoja	<i>Liriomyza spp.</i>	0.5 - 1.0
Chile (0)	Minador de la hoja Ácaro blanco Pulgón saltador	<i>Liriomyza munda</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Bactericera cockerelli</i>	0.5 - 1.0 0.75 - 1.0 0.5 - 0.75
Manzano, Peral (28)	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.5 - 1.0
Aguacatero (14)	Ácaro café	<i>Oligonychus punicae</i>	0.5 - 1.0
Papa (3)	Pulgón saltador	<i>Bactericera cockerelli</i>	0.5 - 0.75
Papayo (14)	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.25 a 1.0 L/1000 lt de agua