NutrymaX®
Forraje

- Biofertilizante Quelatado de Respuesta Inmediata.
- Aumenta la Calidad Nutricional del Forraje.
- Mejora Rendimiento y Calidad del Pasto.
- Recupera y Vigoriza.
- Altamente compatible.

KINSAMEX®

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”.

INGREDIENTE ACTIVO.	% En Peso
Ingredientes activos:	
Nitrógeno (N)	12.12
Fosforo (P)	14.62
Potasio (K)	08.81
Zinc (Zn)	07.42
Aminoácidos Libres	10.47
Algas Marinas	03.74
Extractos Fúlvicos (ExF)	06.12
Extractos Húmicos (ExH)	06.84
Magnesio (Mg)	03.21
Azufre (S)	02.37
Boro (B)	01.07
Cobre (Cu)	01.94
Fierro (Fe)	01.28
Manganeso (Mn)	01.23
Molibdeno (Mo)	01.71
Quelatos (EDTHA)	04.12
Fitohormonas (FtH)	04.83
Ingredientes Inertes:	
Diluyentes y compuestos relacionados.	08.10
TOTAL	**100.00**

Nutrymax® Es un sistema de nutrición compuesto por fórmulas especialmente desarrolladas para aplicación foliar y/o suelo, en cualquier etapa fenológica de la planta, en un cultivo en especifico que previene, corrige y enmienda carencias y/o fisiopatias (Desnutrición), así como también estimula la formación y/o elongación de tejidos después de un daño colateral en el órgano afectado. (Recupera el estado de la planta después del daño). La Potente Línea nutricional **NutrymaX®** está diseñada específicamente para cada cultivo satisfaciendo las necesidades y requerimientos que exigen su fenología, generando mayores ganancias al productor al participar en un mercado competitivo.

NutrymaX® Forraje Es un Biofertilizante Activado Quelatado de Alta Concentración, diseñado especialmente para incorporar y estimular crecimiento apical, robustez y verdosidad favoreciendo así el buen desarrollo de la planta. Además su formulación esta perfectamente balanceada para obtener resultados en plantaciones establecidas después o durante daños originados por deficiencias o desordenes fisiológicos que son manifestadas con hojas pequeñas, moteados cloróticos, recuperando así la producción y reintegrando brotes nuevos a través de sus componentes mejorando el sistema enzimático de pastos y plantas. **NutrymaX® Forraje** esta diseñado para aplicarse solo o junto con los fertilizantes que comúnmente se usa, ya sea (suelo o vía foliar) ya que esta optimizado con ácidos húmicos y fúlvicos por lo tanto este producto es altamente compatible y queda a criterio del aplicador combinarlo (incluyendo calcios).

NutrymaX® Forraje Puede ser aplicado las veces que se requiera como fertilizante o complemento ya que esta creado para cumplir las exigencias y necesidades de reincorporar elementos primordiales, secundarios y menores para brindar nutrición balanceada a pastos forrajeros como plantas gramíneas y leguminosas que se desarrollan en el potrero y sirven para la alimentación del ganado**, Pasto Cuba 22, Camerún, Paulownia, Estrella, Maralfalfa, Elefante, Cayman, Taiwan, Señal, King grass, Sorgo, Forrajero, Soya Forrajera, Caña de estolón, Maiz de Forraje etc.** y aumentar la capacidad de estolones y brotes, tamaño de hoja, mejorar el peso y crecimiento en un forraje nuevo o bien ya adulto con daños fisiopaticos (carente de nutrientes) como moteados cloróticos, favoreciendo el desarrollo y proceso de asimilación lo cual conlleva a una mejor asimilación de nutrientes en los animales alimentados con el forraje fertilizado con este producto.

KINSAMEX®

REG. RSCO-FETE-2485-752-562-583

Titular del registro, formulador y distribuidor:
INDUSTRIAS KINSA DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Carretera Mexicali San Luis Km. 12, Mexicali, Baja California. 21911. México
Tel. 01 33 2460 4273. Web. www.kinsamex.com
E-mail. kinsamex@gmail.com.mx

Dosis Recomendada L/ha	Época de aplicación
1.0 a 1.5 litros por 100 de agua (Suelo)	Plántulas en Invernaderos o almacigo: Aplicar en el agua de riego una vez por semana Iniciando las aplicaciones en la primera semana de desarrollo.
1.0 a 2.0 litros por cada 100 de agua (Suelo) 1.0 a 1.5 litros por cada 200 de agua (Foliar)	Trasplantes en campo: Aplique de 50 a 100 cc de solución por después de 15 días del trasplante, usando las dosis altas en frutales. Repetir el tratamiento tres veces mínimo a intervalos de 15 días.
3.0 a 5.0 litros por hectárea (Suelo) 2.0 a 2.5 litros por hectárea (Foliar)	Proceso de floración, fructificación y/o cosecha: Aplique el producto disuelto en el agua solo o acompañado de otros fertilizantes. Repetir el tratamiento tres veces mínimo a intervalos de semana.
4.0 a 5.0 litros Por cada 100 de agua	Forraje Establecido: Aplique un litro de solución por cada metro de altura del árbol en forma homogénea en el área radicular. Riegue inmediatamente después de la aplicación.
Solución de 10 cc por Litro de agua.	Proceso correctivo de fisiopatia clorótica, en ausencia de Fierro-Hierro. De preferencia reforzar la aplicación foliar-suelo.