

NutrymaX[®]

Sorgo

- Biofertilizante Especifico Quelatado de Respuesta Inmediata.
- Aumenta la Calidad Nutricional.
- Mejora Rendimiento.
- Recupera y Vigoriza.
- Altamente compatible.





“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”.

INGREDIENTE ACTIVO.	% En
Ingredientes activos:	Peso
Nitrógeno (N)	14.31
Fosforo (P)	11.23
Potasio (K)	10.79
Aminoácidos Libres	09.45
Algas Marinas	07.27
Magnesio (Mg)	06.38
Calcio (Ca)	06.26
Azufre (S)	04.82
Extractos Fúlvicos (ExF)	04.49
Extractos Húmicos (ExH)	04.23
Quelatos (EDTHA)	04.42
Boro (B)	03.81
Fierro (Fe)	02.97
Fito hormonas (FtH)	01.65
Silicio (Si)	01.24
Manganeso (Mn)	00.71
Molibdeno (Mo)	00.92
Ingredientes Inertes:	
Diluyentes y compuestos relacionados.	05.06
TOTAL	100.00



REG. RSCO-FETE-2485-752-571-374

Titular del registro, formulador y distribuidor:
INDUSTRIAS KINSA DE MEXICO S. DE R.L., DE C.V.
Carretera Mexicali San Luis Km. 12, Mexicali, Baja California. 21911. México
Tel. 01 33 2480 4273. Web. www.kinsamex.com
E-mail. kinsamex@gmail.com.mx

Nutrymax® Es un sistema de nutrición compuesto por fórmulas especialmente desarrolladas para aplicación foliar y/o suelo, en cualquier etapa fenológica de la planta, en un cultivo en específico que previene, corrige y enmienda carencias y/o fisiopatías (Desnutrición), así como también estimula la formación y/o elongación de tejidos después de un daño colateral en el órgano afectado. (Recupera el estado de la planta después del daño). La Potente Línea nutricional **Nutrymax®** está diseñada específicamente para cada cultivo satisfaciendo las necesidades y requerimientos que exigen su fenología, generando mayores ganancias al productor al participar en un mercado competitivo.

Nutrymax® Sorgo Es un Biofertilizante Activado Quelatado de Alta Concentración, diseñado especialmente para incorporar y estimular crecimiento apical y robustez, favoreciendo así el buen desarrollo de la planta y su sistema Radicular. Además, su formulación está perfectamente balanceada para obtener resultados en plantaciones establecidas después o durante daños originados por deficiencias o desordenes fisiológicos que son manifestadas con hojas pequeñas, moteados cloróticos, aborto, asfixia radicular; recuperando así la producción, reintegrando brotes nuevos, mejorando el crecimiento apical y a través de sus componentes optimizando el sistema enzimático de las plantas y es precursor del crecimiento del mismo.

Nutrymax® Sorgo está diseñado para aplicarse solo o junto con los fertilizantes que comúnmente se usa, ya sea (suelo o vía foliar) ya que esta optimizado con ácidos húmicos y fúlvicos por lo tanto este producto es altamente compatible y queda a criterio del aplicador combinarlo (incluyendo calcio).

Nutrymax® Sorgo Puede ser aplicado las veces que se requiera como fertilizante o complemento ya que esta creado para cumplir las exigencias y necesidades de reincorporar elementos primordiales, secundarios y menores para brindar nutrición balanceada a la planta de Sorgo **Tipo Milo, Kafir, Hegary, Feterita, Durra, Shallu, Kaoliang y sus híbridos, etc.** y aumentar crecimientos foliares y axilares en caso de floración, tamaño de vaina, mejorar el peso y crecimiento de grano en una planta nueva o bien ya adulta con daños fisiopáticos (carente de nutrientes) conocido comúnmente como moteados cloróticos, favoreciendo el desarrollo y proceso de asimilación.

Dosis Recomendada L/ha

0.5 a 1.0 litros por 200 de agua (Suelo)

1.0 a 1.5 litros por cada 100 de agua (Suelo)

0.5 a 1 litros por cada 200 de agua (Foliar)

3.0 a 5.0 litros por hectárea (Suelo)

2.0 a 2.5 litros por hectárea (Foliar)

0.5 a 1.0 litro Por cada 100 de agua (Suelo)

Solución de 10 cc por Litro de agua.

Época de aplicación

Plántulas en Invernaderos o almácigos: Aplicar en el agua de riego una vez por semana Iniciando las aplicaciones en la primera semana de desarrollo.

Trasplantes en campo: Aplique de 50 a 100 cc de solución por después de 15 días del trasplante. Repetir el tratamiento tres veces mínimo a intervalos de 15 días.

Proceso de floración, espiga o Crecimiento de Grano y/o cosecha: Aplique el producto disuelto en el agua solo o acompañado de otros fertilizantes. Repetir el tratamiento tres veces mínimo a intervalos de separación de semana.

Plantaciones establecidas aplicaciones homogéneas en las áreas de cobertura radicular

Proceso correctivo de fisiopatías clorótica. De preferencia reforzar la aplicación foliar-suelo.

