

ApiKaN[®] CE

F-670

- Potente Insecticida de Complejo botánico Ajo, Picante, Canela y Neem.
- Eficiente en control de Plagas que no genera resistencia.
- Actúa de manera sistémica y de contacto.
- Excelente Efecto de Repelencia
- Altamente Compatible.



"COMPOSICIÓN PORCENTUAL".

INGREDIENTE ACTIVO.	% En Peso
Ingredientes activos:	
Complejos de extractos botánicos Concentrados	
Extracto de ajo (<i>Allium sativum</i>). No menos de	28.03
Chile picante (<i>Capsicum frutescens</i>). No menos de	27.65
Canela (<i>Cinnamomum zeylanicum</i>). No menos de	12.41
Extractos de plantas Diversos. De los cuales son: como fuente de flavonoides, oxidantes y enzimas. No menos de	04.09
Ingredientes Inertes:	
Diluyentes y compuestos relacionados.	27.82
TOTAL	100.00



REG. RSCO-INAC-2485-752-562-285

Titular del registro, formulador y distribuidor:
INDUSTRIAS KINSA DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Carretera Mexicali San Luis Km. 12, Mexicali, Baja California. 21911. México
Tel. 01 33 2480 4273. Web. www.kinsamex.com
E-mail. kinsamex@gmail.com.mx

ApiKaN F-670 ® Es un potente insecticida y repelente botánico a base de 3 excelentes ingredientes: chile, ajo y canela, combinándolos provocan desorientación durante la etapa de reproducción de los insectos y obstruye la acción de las feromonas sexuales, disminuyendo de esta forma las poblaciones insectiles con o sin resistencia.

ApiKaN F-670 ® Los compuestos del producto constituyen una señal inequívoca para el insecto que le dificulta encontrar su fuente de alimento (efecto anti alimentario); provoca repelencia y excitación del sistema nervioso que les dificulta el vuelo y la ovoposición; el efecto irritante induce a los insectos a salir de sus refugios, facilitando su control es decir provoca una sobreexcitación del sistema nervioso que conlleva a la desorientación en los insectos Además, penetran a la planta a través de los estomas y es transportado a través del sistema vascular, modificando su complejo enzimático, transpiración y cambio en los líquidos intracelulares de la planta (savia), sin provocar intoxicación en la planta.

ApiKaN F-670 ® Regula poblaciones plaga de mosquita blanca, pulgones, trips, ácaros, chinches, picudos, cochinillas, escamas, mosca de la fruta, hormigas, orugas, chapulines, escarabajos, mosquitos, nematodos y larvas de lepidópteros (barrenadores, minadores, taladradores, cortadores, enrolladores de las hojas, medidores). Sus usos también incluyen la repelencia de plagas de granos almacenados, polillas o gorgojos, en invernaderos o bien en proceso de plántulas en charolas.

ApiKaN F-670 ® Esta diseñado para aplicarse solo o junto con otros insecticidas químicos que comúnmente se usa, ya que esta optimizado para romper la resistencia o tolerancia de moléculas en los insectos por lo tanto este producto es altamente compatible y queda a criterio del aplicador combinarlo (incluyendo calcios).

ApiKaN F-670 ® Viene en forma liquida y puede ser aplicado sólo o combinado con otros plaguicidas en aspersiones. Para efecto correctivo indagarse de la dosis correcta con el ingeniero en campo.

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Plántulas Invernaderos Charolas Germinadoras	Trips (<i>Frenkliniella occidentalis</i> , <i>F. sp.</i>), Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>), Pulgón (<i>Myzus persicae</i>)	0.3 a 0.5 L/200 de agua 0.5 a 1.0 L/200 de agua	-Aplicar de forma foliar uniformemente. -Realizar la aplicación foliar antes de introducir las charolas al invernadero.
Gramineas Arroz, Centeno, Bambu, Cebada, Caña de Azúcar, Maiz, Sorgo, etc.	Chicharrita (<i>Empoasca spp</i>), Mosca midge (<i>Contarinia sorghicola</i>), Chinche lygus (<i>Lygus lineolaris</i>)	0.5 a 1.0 L/200 de agua 1.0 a 2.5 L/ha	Realizar aplicaciones foliares cuando se detecten los primeros individuos adultos.
Hortalizas Acelga, Brocoli, Calabaza, Pepino, Pimiento, Tomate, Chile, Rabano, Zanahoria, etc.	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>), Trips (<i>Thrips tabaci</i>), Pulgón (<i>Myzus persicae</i>), Acaro blanco (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	0.5 a 1.0 L/200 de agua 1.0 a 3.0 L/ha	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalos de 4 días cuando se detecten los primeros individuos adultos.
Frutales de porte medio-alto: Aguacate, Mango, Rambután, etc.	Trips (<i>Frenkliniella occidentalis</i>), Piojo arinoso (<i>Dysmicoccus brevipes</i>), Ácaros (<i>Panonychus ulmi</i>), Minador de la hoja (<i>Liriomyza ssp</i>), Escama (<i>Aonidiella ssp</i>), Arador o negrilla (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>), Conchuela (<i>Epilachna varivestis</i>)	1.0 a 3.0 L/100 de agua 1.5 a 3.5 L/ha	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros individuos adultos.
Diversos por gasto o consumo de agua según el follaje	Plagas con resistencia elevada de incidencias notables	0.5 a 1.0 L/200 de agua	Realizar aplicaciones foliares con repeticiones a intervalos de 4 a 6 días, mezclar con insecticidas químicos, organicos o biológicos de su preferencia.