


GenOxeL[®]_{CE} 800

- Potente Antibiótico de Amplio Espectro que Combina la Triple acción de la Gentamicina, Oxitetraciclina y Fitoanticipina.
- Acción preventiva y complementaria estimulando las defensas de la planta.
- Poder de Respuesta Inmediata en Control y Prevención.
- Altamente compatible.



BACTERICIDA



“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”.

INGREDIENTE ACTIVO.	% En Peso
Ingredientes activos:	
Gentamicina: Sulfato de Gentamicina (Equivalente a 180 g de I.A./L)	No menos de 18.10
Oxitetraciclina: Clorhidrato de oxitetraciclina (Equivalente a 100 g de I.A./L) No menos de	09.80
Fitoanticimina: Metabolitos secundarios de naturaleza fenólica con un contenido de ácido hidroxicinámico (HCAA), ácido salicílico (SA), extractos (Equivalentes a 120 g I.A./L) No menos de	08.00
Ingredientes Inertes:	
Diluyente, portadores sólidos, dispersantes, adherentes y agente de suspensión, antiespumante, colorante, amortizadores de toxicidad y compuestos relacionados.	64.10
TOTAL	100.00



REG. RSCO-MEZC-2485-752-562-461

Titular del registro, formulador y distribuidor:
INDUSTRIAS KINSA DE MEXICO S. DE R.L., DE C.V.
Carretera Mexicali San Luis Km. 12, Mexicali, Baja California. 21911. México
Tel. 01 33 2480 4273. Web. www.kinsamex.com
E-mail. kinsamex@gmail.com.mx

GenOxEL 800 CE ® Es un potente antibiótico de amplio espectro que combina la Triple acción de sus ingredientes activos para una mejor protección a tu cultivo en un solo producto: sistémico, preventivo y curativo. Sus activos incrementan el poder de respuesta para el control de una amplia gama de bacterias que infestan los cultivos agrícolas. La combinación de sus ingredientes fortalecen 3 modos de acción:

1. Acción multi sitio, inhibe la síntesis de proteínas uniéndose irreversiblemente al ribosoma bacteriano.
2. Acción sinérgica con efecto bacteriostático.
3. Acción preventiva y complementaria estimulando las defensas de la planta.

GenOxEL 800 CE ® Protege cultivos contra enfermedades bacterianas y además controla Mildiu y Tizón Tardío los cuales hacen referencia a un grupo de hongos fitopatógenos causantes de enfermedades en las plantas y que muestran síntomas similares. Generalmente sobreviven al invierno y afectan las hojas, los tallos y los frutos, en los que pueden aparecer en cualquier fase del desarrollo del cultivo, manifestándose las lesiones inicialmente en forma de pequeñas manchas negras, que crecen con rapidez.

GenOxEL 800 CE ® Evita una rápida dispersión, previniendo la defoliación y muerte de las plantas, asegurando cualquier etapa de desarrollo del cultivo, creando una capa de barrera física natural y acumulación de compuestos defensivos inducidos por enzimas fenólicas con el fin de hacer frente a ataques patogénicos de diversa naturaleza desarrollando una serie de mecanismos de tipo inducible, como la respuesta inmune y el silenciamiento de RNA, que se activan tras la entrada del patógeno. **GenOxEL 800 CE** ® Viene en forma líquida y puede ser aplicado sólo o combinado con otros plaguicidas en aspersiones terrestres o foliares. Para efecto correctivo indagarse de la dosis correcta con el ingeniero en campo.

Circunstancia o Evento	Aplicación	Dosis
Plántulas y/o Invernaderos	Foliar	- 3 ml por cada litro de agua cuando la planta tiene de 2 a 6 hojas verdaderas; 5 ml por cada litro de agua cuando la planta tiene 8 hojas verdaderas o más. - 5 ml por cada litro de agua para materiales aislantes, mallas, plásticos, etc. (solo en caso de ser reutilizados y haber presentado problemas fitopatógenos, se podrá combinar con fungicidas preferentemente mineralizados.)
Control de Bacteria en Follaje/Hojas (<i>Burkholderia andropogonis</i> , <i>Pseudomonas solanacearum</i> E.F. Smith, <i>Xanthomonas arylae</i> , <i>Pseudomonas lachrymans</i> , <i>Acidovorax avenae</i> , <i>Xanthomonas vesicatoria</i>)	Foliar	- Solución de 0.5 L. a 1.0 por 200 Lts. De agua (Solo o Acompañado de otros Productos) - Solución de 2.5 a 5.0 cc/ml por litro de agua. (Solo o Acompañado de otros Productos) Con una cobertura homogénea, no afecta floración o desarrollo del cultivo. Así mismo se deberá de realizar de 2 a 3 repeticiones con intervalos de 4 a 8 días de separación, según el cultivo y la incidencia.
Control de Bacteria en Raíz (<i>Erwinia</i> sp., <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv <i>chrysanthemi</i>)	Aspersión o Inyección	- Solución de 0.5 a 1 L. por 200 Lts. De agua (Solo o Acompañado de otros Productos), Podrá ser aplicado al Tallo con escurrimiento Radical o Bien Directo a la Raíz.
	Sistema de Riego	- Solución de 1 L. por 200 Lts. De agua (Solo o Acompañado de otros Productos) preferentemente protectante para una mayor cobertura y control bacteriostático.